



Informovaný souhlas – Chirurgie hýžděvého implantátu

Slečna:

Rodné číslo (pro číslo pasu cizince a datum narození):

Trvalý pobyt:

Tel./e-mail

(dále jen „Klient“)

Milá paní,

Velmi si vážíme toho, že jste si vybrali naši instituci. Celý tým naší kliniky je připraven udělat maximum pro to, aby chirurgický zákrok přinesl výsledky k vaší spokojenosti. Doufáme, že kombinace moderních přístrojů, obslužné dovednosti našich lékařů, profesionalita a obětavost našich sester přispěje k přeměně Vašich estetických či zdravotních potíží ve spokojenost s výsledkem zákroku a přejeme Vám příjemný pobyt na naší klinice .

INSTRUKCE

Toto je dokument informovaného souhlasu, který byl připraven, aby vám pomohl informovat vás o operacích liftingu hýždí, jejich rizicích a také o alternativní léčbě.

Je důležité, abyste si tyto informace pečlivě a úplně přečetli. Prosím inicializujte každou stránku s uvedením že jste si přečetli stránku a podepsali souhlas s operací, jak navrhl váš plastický chirurg a jak jste se dohodli.

OBECNÁ INFORMACE

Zvednutí hýždí je chirurgický zákrok, který může odstranit přebytečnou kůži a tukovou tkáň z boků, vnějších stehen, zad a hýždí a může také zahrnovat umístění tukových nebo hýžděvých implantátů do určitých oblastí hýždí, aby se tato oblast zlepšila. Váš

Informed Consent – Buttock implant Surgery/Lower Body Lift

Ms:

Birth registration number (for foreign national's passport number and date of birth):

Permanent residence:

Tel./e-mail

(hereinafter referred to as the "Client")

Dear Madam,

We are thoroughly appreciative that you have chosen our institution. Our clinic's entire team is prepared to do its utmost in order to ensure that the surgical procedure produces results to your satisfaction. We hope that the combination of modern appliances, the operating skills of our doctors, the professionalism and devotion of our nurses will help transform your aesthetic or health complaint into contentment with the result of the procedure, and we wish you a pleasant stay at our clinic.

INSTRUCTIONS

This is an informed-consent document that has been prepared to help inform you about buttock lift surgeries, its risks, as well as alternative treatment(s).

It is important that you read this information carefully and completely. Please initial each page, indicating that you have read the page, and sign the consent for surgery, as proposed by your plastic surgeon and agreed upon by you.

GENERAL INFORMATION

A buttock lift is a surgical procedure that may remove excess skin and fat tissue from the hips, outer thighs, back, and buttocks, and may also include placing fat or buttock implants in certain areas of the buttocks to enhance that region. Your procedure may also

postup může také zahrnovat liposukci a/nebo tukové štěpování (reinjekce tuku nebo liposkulptování) do těchto nebo jiných oblastí pro tvarování nebo zvětšení objemu. Zvednutí hýždí není chirurgická léčba nadváhy. Obézní jedinci, kteří chtějí zhubnout, by měli odložit všechny formy operací tvarování těla, dokud nedosáhnou stabilní hmotnosti.

Existuje celá řada různých technik používaných plastickými chirurgy pro lifting hýždí. Zvednutí hýždí lze kombinovat s jinými formami konturovacích operací, včetně lipektomie s pomocí odsávání, nebo lze provést současně s jinými elektivními operacemi. Vaše operace může vyžadovat transfuzi krevních produktů; to se však případ od případu liší.

ALTERNATIVNÍ LÉČBY

Alternativní formy léčby zahrnují neošetřování oblastí volné kůže a tukových usazenin chirurgicky. Lipektomie s odsáváním může být chirurgickou alternativou k liftingu hýždí, pokud má jedinec s normální hmotností dobrý tonus kůže a lokalizovaná ložiska břišního tuku. Dietní a cvičební programy mohou být přínosem pro celkové snížení nadměrného tělesného tuku a zlepšení kontur. Rizika a potenciální komplikace jsou také spojeny s alternativními chirurgickými formami léčby.

VLASTNÍ RIZIKA OPERACE ZVEDÁNÍ HÝDLA

Každý chirurgický zákrok s sebou nese určitou míru rizika a je důležité, abyste těmto rizikům a možným komplikacím s nimi spojenými porozuměli. Navíc každý postup má svá omezení. Volba jednotlivce podstoupit chirurgický zákrok je založena na srovnání rizika a potenciálního přínosu uvedeného postupu. Přestože většina pacientů tyto komplikace nepocítuje, měli byste každou z nich probrat se svým plastickým chirurgem abyste se ujistili, že rozumíte všem možným následkům operace zvednutí hýždí.

SPECIFICKÁ RIZIKA ZVEDÁNÍ/AGUMENTACE HÝŽDÍ

Pubické zkreslení:

Je možné, i když neobvyklé, že se u pacienta vyvine deformace jejich pubické oblasti. Pokud k tomu dojde, může být nutná další léčba, včetně chirurgického zákroku.

Tuková/vzduchová embolie:

Ve vzácných případech, během nebo po liposukci a/nebo transplantaci tuku, mohou tukové částice nebo vzduch vstoupit do cévního systému a mohou se dostat do srdce, plic nebo mozku. To může vést k významným komplikacím, včetně smrti.

include liposuction and/or fat grafting (reinjection of fat or liposculpting) to these or other areas for shaping or volume enhancement. A buttock lift is not a surgical treatment for being overweight. Obese individuals who intend to lose weight should postpone all forms of body contouring surgery until they have reached a stable weight.

There are a variety of different techniques used by plastic surgeons for a buttock lift. A buttock lift can be combined with other forms of body-contouring surgeries, including suction-assisted lipectomy, or be performed at the same time as other elective surgeries. Your surgery may require transfusion of blood products; however, this varies on a case-by-case basis.

ALTERNATIVE TREATMENTS

Alternative forms of management include not treating the areas of loose skin and fat deposits with surgery. Suction-assisted lipectomy surgery may be a surgical alternative to a buttock lift if there is good skin tone and localized abdominal fat deposits in an individual of normal weight. Diet and exercise programs may be of benefit for the overall reduction of excess body fat and contour improvements. Risks and potential complications are also associated with alternative surgical forms of treatments.

INHERENT RISKS OF BUTTOCK LIFT SURGERY

Every surgical procedure involves a certain level of risk, and it is important that you understand these risks and the possible complications associated with them. In addition, every procedure has its limitations. An individual's choice to undergo a surgical procedure is based on the risk-to-potential benefit comparison of the said procedure. Although the majority of the patients do not experience these complications, you should discuss each of them with your plastic surgeon to make sure you understand all possible consequences of buttock lift surgery.

SPECIFIC RISKS OF BUTTOCK LIFT/AUGMENTATION SURGERY

Pubic

It is possible, though unusual, for patient to develop distortion of their pubic area. Should this occur, additional treatments, including surgery may be necessary.

Distortion:

Fat/Air Embolism:

In rare cases, during or after liposuction and/or fat grafting, fat particles or air can enter the vascular system and can travel to the heart, lungs, or the

Seroma (sbírka tekutin):

I když zřídka se může tekutina hromadit mezi kůží a pod ní ležícími tkáněmi po chirurgickém zákroku, traumatu nebo intenzivním cvičení. Pokud se tento problém vyskytne, může vyžadovat další postupy pro odvodnění tekutiny. Aby se tomu zabránilo, obvykle se používají chirurgické drény.

Použití odtoků:

Během vašeho chirurgického zákroku může váš lékař považovat za nutné umístit drén(y). Drén je malá trubice, která odvádí tekutinu z oblasti, která byla operována. Budete poučeni o použití vašeho odtoku. Umístění drénu může vyžadovat malý samostatný řez. Drén bude odstraněn, když váš lékař usoudí, že to již není nutné. Místo odtoku může být v době odstraňování odtoku uzavřeno. Uzavření místa odtoku může vyžadovat speciální chirurgickou pásku nebo někdy steh. Váš lékař může ponechat místo otevřené, aby z rány vytekla zbytková tekutina.

Zpožděné hojení:

Je možné narušení rány nebo opožděné hojení rány. Některé oblasti břicha, boku, zad nebo hýždí se nemusejí normálně hojit a jejich hojení může trvat dlouho. Některé oblasti kůže mohou odumřít nebo odloupnout. To může vyžadovat časté výměny obvazu nebo další operace k odstranění nezhojené tkáně. Jedinci, kteří mají snížený přívod krve do tkáně z minulých operací nebo radiačních terapií, mají zvýšené riziko hojení ran a špatný výsledek operace. Kuřáci mají větší riziko ztráty kůže a komplikací hojení ran.

Změna barvy kůže / otok:

Po operaci se obvykle objevují modřiny a otoky. Kůže v místě chirurgického zákroku nebo v jeho blízkosti se může jevit buď světlejší nebo tmavší než okolní kůže. I když je to méně časté, otok a změna barvy kůže mohou přetrvávat po dlouhou dobu a ve vzácných situacích mohou být trvalé.

Změna pocitu:

Je běžné zaznamenat sníženou (nebo ztrátu) kožní citlivosti v oblastech, které byly po operaci. Je vzácné zažít trvalé změny v pocitu, ale je to možné. Snížená (nebo úplná ztráta) kožní citlivosti nemusí po operaci zcela vymizet. Existuje velmi malé riziko poranění motorického nervu, které může mít za následek poškození funkcí dolních končetin.

brain. This can result in significant complications, including death.

Seromas (Fluid Collection):

Though infrequently, fluid may accumulate between the skin and the underlying tissues following surgery, trauma, or vigorous exercise. Should this problem occur, it may require additional procedures for drainage of fluid. To help prevent this, surgical drains are usually employed.

Use of Drains:

During your surgery, your doctor may find it necessary to place a drain(s). A drain is a small tube that drains fluid out from the area that was operated on. You will be instructed on the use of your drain. Placement of the drain may require a small separate incision. The drain will be removed when your doctor feels it is no longer necessary. The drain site may be closed at the time of drain removal. Closing the drain site may require special surgical tape or sometimes a suture. Your doctor may leave the site open to drain any residual fluid under the wound.

Delayed

Wound disruption or delayed wound healing is possible. Some areas of the abdomen, flank, back, or buttocks may not heal normally, and may take a long time to heal. Some areas of the skin may die or slough off. This may require frequent dressing changes or further surgeries to remove the non-healed tissue. Individuals who have decreased blood supply to the tissue from past surgeries or radiation therapies may be at increased risk for wound healing and poor surgical outcome. Smokers have a greater risk of skin loss and wound healing complications.

Healing:**Skin Discoloration/Swelling:**

Bruising and swelling normally occurs following surgery. The skin in or near the surgical site can appear either lighter or darker than surrounding skin. Although uncommon, swelling and skin discoloration may persist for long periods of time, and in rare situations, may be permanent.

Change in Sensation:

It is common to experience diminished (or loss of) skin sensation in areas that have had surgery. It is rare to experience permanent changes in sensation, but it is possible. Diminished (or complete loss of) skin sensation may not totally resolve after the surgery. There is a very small risk of motor nerve injury, which may result in impairment of lower extremity functions.

Jizvy:

Všechny operace zanechávají jizvy, některé viditelnější než jiné. Ačkoli se očekává dobré hojení ran po chirurgickém zákroku, výsledkem tohoto chirurgického zákroku budou dlouhé výrazné jizvy, které jsou trvalé. Abnormální jizvy se mohou objevit v kůži a hlubších tkáních. Jizvy mohou být neatraktivní a mohou mít jinou barvu než okolní kůže. Vzhled jizvy se může také lišit v rámci stejné jizvy. Jizvy mohou být asymetrické (na pravé a levé straně těla se mohou lišit). Existuje možnost viditelných stop na kůži po stehech. Tyto jizvy mohou během prvních několika týdnů/měsíců vystouplé a červené, ale obvykle se časem usadí. Někteří pacienti jsou však náchylní k „hypertrofickým“ nebo „keloidním“ jizvám, tedy výrazným, vystouplým, červeným jizvám, které se neusazují. Může být zapotřebí další léčba léky a/nebo chirurgický zákrok.

Opětovné uvolnění pokožky:

Téměř všichni pacienti, kteří mají tento postup, zaznamenají opětovné uvolnění kůže v průběhu času. K tomu dochází v důsledku přirozené reakce těla na protažení. Pacienti, kteří ztratili masivní množství hmotnosti, jsou náchylní k tomuto jevu. Bez ohledu na to, jak moc vám chirurg v době operace napne kůži, časem se do určité míry znovu uvolní. Stupeň uvolnění kůže se u jednotlivců liší.

Zploštění hýždí:

Operace zvedání hýždí mohou vést ke zploštění hýžděvé oblasti. Tento výsledek má za následek napnutí kůže dolní části zad směrem nahoru. Chirurg může provést určité postupy, aby tento účinek minimalizoval. Tyto výkony lze provést během původního chirurgického zákroku nebo sekundárně, v závislosti na preferencích pacienta a chirurga.

Nepravidelnosti kontur pleti:

Mohou se vyskytnout nepravidelnosti tvaru a tvaru. Může se objevit viditelné a hmatatelné zvrásnění kůže. Zbytkové kožní nepravidelnosti na koncích řezů nebo „psích uší“ jsou vždy možné, když je kůže přebytečná. Ty se mohou časem zlepšit nebo mohou být nutné chirurgicky korigovat. U pacientů, kteří mají tukový štěp, mohou mít oblasti vtlačení, asymetrie, plnosti a/nebo pevnosti v důsledku liposukce a/nebo přenosu tuku. I ty se mohou časem zlepšit nebo je nutné je chirurgicky upravit.

Asymetrie:

Po operaci nemusí dojít k symetrickému vzhledu těla. K normální asymetrii tělesných rysů mohou přispívat faktory, jako je tón pleti, tukové zásoby, prominence kostry a svalový tonus. Většina pacientů má před

Scars:

All surgeries leave scars, some more visible than others. Although good wound healing after a surgical procedure is expected, this surgery will result in long, prominent scars that are permanent. Abnormal scarring may occur within the skin and deeper tissues. Scars may be unattractive and be of different color than the surrounding skin. Scar appearance may also vary within the same scar. Scars may be asymmetrical (appear different on the right and left side of the body). There is a possibility of visible marks in the skin from sutures. These scars may become raised and red in the first few weeks/months, but usually settle down over time. However, some patients are prone to “hypertrophic” or “keloid” scars, i.e. prominent, raised, red scars that do not settle. Further treatments with medications and/or surgery may be required.

Re-loosening of Skin:

Almost all patients who have this procedure will notice re-loosening of the skin over time. This occurs due to the body's inherent response to stretch. Patients who have lost massive amounts of weight are prone to this phenomenon. No matter how tight the surgeon makes your skin at the time of the surgery, it will re-loosen with time to a certain degree. The degree of skin loosening differs between individuals.

Flattening of the Buttocks:

Buttock lift surgeries may result in flattening of the buttock region. The upward tightening of the lower back skin results in this outcome. The surgeon may perform certain procedures to minimize this effect. These procedures may be performed during the original surgery or secondarily, depending on the patient's and the surgeon's preference.

Skin Contour Irregularities:

Contour and shape irregularities may occur. Visible and palpable wrinkling of the skin may occur. Residual skin irregularities at the ends of the incisions, or “dog ears,” are always a possibility when there is excessive skin. These may improve with time, or may need to be surgically corrected. In patients who have fat grafting, they may have areas of indentation, asymmetry, fullness, and/or firmness due to the liposuction and/or fat transfer. These, too, may improve with time, or may need to be surgically corrected.

Asymmetry:

Symmetrical body appearance may not result after surgery. Factors such as skin tone, fat deposits, skeletal prominence, and muscle tone may

provedením jakékoli operace rozdíl mezi pravou a levou stranou těla. Pro snížení asymetrie mohou být nutné další operace.

Kapsle

Kapsle znamená vytvoření silného vazivového zapouzdření kolem implantátu. Jedná se o komplikaci, která se může objevit kdykoli po operaci. Vazivové pouzdro se začne stahovat a tím deformovat implantát a vnitřní tvar hýždí. Implantáty ztvrdnou na dotek vlivem vnitřního tlaku. Postižená hýždě může bolet. Stížnosti nejsou vždy tak výrazné a rozvoj příznaků může být zastaven. Stav pak nevyžaduje žádné řešení. Jinak doporučujeme masáže nebo chirurgický zákrok, který není jednoduchý ani bez rizika. Toto je nejčastěji popisovaná komplikace při augmentaci hýždí. Kolem hýžděvého implantátu se vždy vytvoří vazivové zapouzdření – pouzdro. Vazivová tkáň tak přirozeně reaguje na vstup cizího tělesa do organismu. Kapsle tak se tvoří u všech pacientů a mohou být tenké nebo ztlustělé. Jejich tvorba se liší podle jednotlivce. V některých případech může dojít ke konstrikci – kontrakci pouzdra kolem implantátu, která je doprovázena bolestivostí, ztuhlostí až ztvrdnutím hýždě. Důvody, proč k zapouzdření dochází, nejsou dodnes jasné a vytvoření kapsle nelze předem předvídat.

OBEČNÁ RIZIKA CHIRURGIE

Léčebné problémy:

Některé zdravotní stavy, doplňky stravy a léky mohou zpozdít a narušit hojení. Pacienti s masivní ztrátou hmotnosti mohou mít zpoždění v hojení, které by mohlo vést k rozpadu řezů, infekcím a tkáňovým změnám, což by mělo za následek potřebu další lékařské péče, operací a prodloužených hospitalizací. Pacienti s cukrovkou nebo ti, kteří pravidelně užívají léky, jako jsou steroidy, mohou mít dlouhodobé problémy s hojením. Kouření způsobí zpoždění v procesu hojení, což často vede k nutnosti dalších operací. S hojením jsou spojena obecná rizika, jako je otok, krvácení, možnost dalších operací, prodloužená rekonvalescence, změny barvy, změny tvaru, infekce, nesplnění pacientových cílů a očekávání a další výdaje pro pacienta. Může také nastat delší doba rekonvalescence kvůli délce operace a anestezie. Pacienti s výraznou ochablou kůže (jako u pacientů po operaci hýžděvého liftingu) budou mít po operaci stále stejně ochablou kůži. Kvalita nebo elasticita kůže

contribute to normal asymmetry in body features. Most patients have differences between the right and left side of their bodies before any surgery is performed. Additional surgeries may be necessary to attempt to diminish asymmetry.

Capsule

Capsule means the formation of a thick ligament encapsulation around the implant. This is a complication which may occur at any time after the operation. The ligament capsule begins to constrict and thus deform the implant and the inner shape of the buttock. The implants become hard to the touch due to the impact of internal pressure. The affected buttock may be sore. Complaints are not always so pronounced, and the development of the symptoms may be halted. The condition then does not require any solution. Otherwise we recommend massages or a surgical procedure, which is not simple or without risk. This is the most commonly described complication upon buttock augmentation. A ligament encapsulation – capsule – always forms around the buttock implant. The ligament tissue is thus reacting naturally to the entry of a foreign body into the organism. Capsules thus form in all patients, and may be thin or thickened. Their formation varies according to the individual. In some cases constriction – contraction of the capsule around the implant may occur, which is accompanied by soreness, stiffness to hardening of the buttock. The reasons for why capsulation occurs are not clear to this day, and the formation of a capsule cannot be foreseen in advance.

GENERAL RISKS OF SURGERY

Healing Issues:

Certain medical conditions, dietary supplements, and medications may delay and interfere with healing. Patients with massive weight loss may have a healing delay that could result in the incisions coming apart, infections, and tissue changes resulting in the need for additional medical care, surgeries, and prolonged hospitalizations. Patients with diabetes or those taking medications such as steroids on a regular basis may have prolonged healing issues. Smoking will cause a delay in the healing process, often resulting in the need for additional surgeries. There are general risks associated with healing, such as swelling, bleeding, possibility of additional surgeries, prolonged recovery, color changes, shape changes, infection, not meeting patient's goals and expectations, and added expenses to the patient. There may also be a longer recovery period due to the length of surgery and anesthesia. Patients with significant skin laxity (like in patients having buttock

se nezmění a někdy v budoucnu dojde k opětovnému uvolnění kůže, u některých rychleji než u jiných. Existují nervová zakončení, která mohou být ovlivněna hojícími se jizvami po operaci. I když nemusí dojít k velkému poranění nervu, malá nervová zakončení se mohou během hojení příliš aktivovat a způsobit bolestivou nebo přecitlivělou oblast kvůli malému sensorickému nervu, který je uložen ve tkáni jizvy. Často mohou tento problém vyřešit masáže a včasné nechirurgické zákroky. Je důležité diskutovat o bolesti po chirurgickém zákroku s vaším chirurgem.

Krvácející:

Je možné, i když neobvyklé, zažít epizodu krvácení během nebo po operaci. Dojde-li k pooperačnímu krvácení, může to vyžadovat okamžitou léčbu k vypuštění nahromaděné krve, nebo můžete vyžadovat krevní transfuzi, i když takové případy jsou vzácné. Sběr krve, který může nastat pod vaše kůže po operaci se nazývá hematoma. Zvýšená aktivita příliš brzy po operaci může vést ke zvýšenému riziku krvácení a dalším operacím. Důležité je dodržovat pooperační pokyny a na určenou dobu omezit cvičení a namáhavé činnosti. „Byliny“ a doplňky stravy bez předpisu mohou zvýšit riziko chirurgického krvácení. Hematom se může objevit kdykoli, obvykle v prvních třech týdnech po poranění operační oblasti. Pokud jsou k léčbě ztráty krve nutné krevní transfuze, existuje riziko infekcí souvisejících s krví, jako je hepatitida a HIV (AIDS). Váš chirurg může po operaci poskytnout léky k prevenci krevních sraženin. Léky, které se používají k prevenci krevních sraženin v žilách, mohou způsobit krvácení a snížení krevních destiček.

Infekce:

Po operaci se mohou objevit infekce, i když nejsou časté. Pokud dojde k infekci, může být nutná další léčba, včetně antibiotik, hospitalizace nebo dalších operací. Je důležité informovat svého chirurga o jakýchkoli jiných infekcích, jako je anamnéza infekcí *Staphylococcus aureus* (MRSA) rezistentních na meticilin, otevřená rána, nedávná infekce horních cest dýchacích/pneumonie, zarostlý nehet, kousnutí hmyzem, absces zubů nebo močových cest. Infekce. Infekce v jiných částech těla mohou vést k infekci v operované oblasti. Pooperační infekce často vedou k rozsáhlejšímu zjizvení a predisponují pacienta k revizní operaci.

lift surgery) will continue to have the same lax skin after the surgery. The quality or elasticity of the skin will not change, and recurrence of skin looseness will occur at some time in the future, quicker for some than others. There are nerve endings that may become affected by healing scars from surgery. While there may not be a major nerve injury, small nerve endings may become too active during the healing period, producing a painful or oversensitive area due to the small sensory nerve being embedded in the scar tissue. Often, massages and early non-surgical interventions can resolve this issue. It is important to discuss post-surgical pain with your surgeon.

Bleeding:

It is possible, though unusual, to experience a bleeding episode during or after the surgery. Should post-operative bleeding occur, it may require emergency treatment to drain the accumulated blood, or you may require a blood transfusion, though such occurrences are rare. The collection of blood that can occur under your skin following the surgery is referred to as a hematoma. Increased activity too soon after surgery can lead to increased chances of bleeding and additional surgeries. It is important to follow postoperative instructions, and to limit exercises and strenuous activities for the instructed time. Non-prescription “herbs” and dietary supplements can increase the risk of surgical bleeding. Hematoma can occur at any time, usually in the first three weeks following injury to the operative area. If blood transfusions are necessary to treat blood loss, there is the risk of blood-related infections such as hepatitis and HIV (AIDS). Your surgeon may provide medications after your surgery to prevent blood clots. Medications that are used to prevent blood clots in veins can produce bleeding and decreased blood platelets.

Infection:

Infections, although uncommon, can occur after the surgery. Should an infection occur, additional treatments, including antibiotics, hospitalization, or additional surgeries, may be necessary. It is important to tell your surgeon of any other infections, such as a history of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) infections, an open wound, recent upper respiratory infection/pneumonia, ingrown toenail, insect bite, tooth abscess, or urinary tract infection. Infections in other parts of the body may lead to an infection in the operated area. Post-operative infections often result in more extensive scarring, and predispose the patient to revision surgery.

Pevnost:

Po operaci může dojít k nadměrné pevnosti v důsledku vnitřních jizev. Výskyt tohoto jevu nelze předvídat. Mohou být nutné další léčby včetně chirurgických zákroků.

Citlivost kůže:

Po operaci se může objevit svědění, citlivost nebo přehnané reakce na vysoké nebo nízké teploty. To obvykle vymizí během hojení, ale ve vzácných situacích může být chronické.

Separace hlavní rány:

Rány se mohou po operaci oddělit. Pokud k tomu dojde, může být nutná další léčba včetně chirurgických zákroků.

Šití:

Většina chirurgických technik používá hluboké stehy. Tyto stehy si můžete všimnout po operaci. Stehy mohou spontánně propíchnout kůži, zviditelnit se nebo způsobit podráždění, které vyžaduje odstranění stehu.

Zpožděné hojení:

Je možné narušení rány nebo opožděné hojení rány. Některé oblasti kůže se nemusejí normálně hojit a jejich hojení může trvat dlouho. Oblasti kůže mohou odumřít. To může vyžadovat časté výměny obvazu nebo další operace k odstranění nezhojené tkáně. Jedinci, kteří mají snížený přívod krve do tkáně z minulých operací nebo radiačních terapií, mohou mít zvýšené riziko hojení ran a špatný výsledek operace. Kuřáci mají větší riziko ztráty kůže a komplikací hojení ran.

Poškození hlubších struktur:

Při jakémkoli chirurgickém zákroku existuje možnost poranění hlubších struktur, včetně nervů, krevních cév, lymfatických uzlin, svalů a plic (pneumotorax). Možnost, že k tomu dojde, se liší podle typu prováděného postupu. Poranění hlubších struktur může být dočasné nebo trvalé.

Tuková nekróza:

Tuková tkáň nacházející se hluboko v kůži může odumřít. To může vytvořit oblasti pevnosti v kůži. Mohou být nutné další operace k odstranění oblastí nekrózy tuku. Existuje možnost konturových nepravidlostí kůže, které mohou být důsledkem tukové nekrózy.

Chirurgická anestezie:

Místní i celková anestezie s sebou nese rizika. Existuje možnost komplikací, zranění a dokonce i smrti ze všech forem chirurgické anestezie nebo sedace.

Firmness:

Excessive firmness can occur after the surgery due to internal scarring. The occurrence of this phenomenon is not predictable. Additional treatments including surgeries may be necessary.

Skin Sensitivity:

Itching, tenderness, or exaggerated responses to hot or cold temperatures may occur after the surgery. This usually resolves during healing, but in rare situations, it may be chronic.

Major Wound Separation:

Wounds may separate after surgery. Should this occur, additional treatments including surgeries may be necessary.

Sutures:

Most surgical techniques use deep sutures. You may notice these sutures after your surgery. Sutures may spontaneously poke through the skin, become visible, or produce irritation that requires suture removal.

Delayed Healing:

Wound disruption or delayed wound healing is possible. Some areas of the skin may not heal normally, and may take a long time to heal. Areas of skin may die. This may require frequent dressing changes or further surgeries to remove the non-healed tissue. Individuals who have decreased blood supply to the tissue from past surgeries or radiation therapies may be at increased risk for wound healing and poor surgical outcome. Smokers have a greater risk of skin loss and wound healing complications.

Damage to Deeper Structures:

There is the potential for injury to deeper structures, including nerves, blood vessels, lymphatics, muscles, and lungs (pneumothorax) during any surgical procedure. The potential for this to occur varies according to the type of procedure being performed. Injury to deeper structures may be temporary or permanent.

Fat Necrosis:

Fat tissue found deep in the skin may die. This may produce areas of firmness within the skin. Additional surgeries to remove areas of fat necrosis may be necessary. There is a possibility of contour irregularities in the skin that may result from fat necrosis.

Surgical Anesthesia:

Both local and general anesthesia involve risks. There is a possibility of complications, injuries, and even

Šok:

Ve vzácných případech může váš chirurgický zákrok způsobit vážné trauma, zejména pokud jsou prováděny vícenásobné nebo rozsáhlé postupy. Ačkoli závažné komplikace nejsou časté, infekce nebo nadměrná ztráta tekutin mohou vést k vážným onemocněním a dokonce ke smrti. Když dojde k chirurgickému šoku, bude nutná hospitalizace a další léčba.

Bolest:

Po operaci pocítíte bolest. Po operaci se může objevit bolest různé intenzity a trvání. Jste-li pacient s chronickou bolestí, kterého sleduje praktický lékař pro léčbu bolesti, můžete být požádáni, abyste předoperačně navštívili tohoto praktického lékaře, který vám pomůže při zvládnutí bolesti v pooperačním období. Chronická bolest se může vzácně objevit v důsledku uvíznutí nervů ve tkáni jizvy nebo v důsledku natažení tkáně.

Srdeční a plicní komplikace:

Plicní komplikace se mohou vyskytnout sekundárně po krevních sraženinách (plicní embolie), ukládání tuku (tukové embolie), zápalu plic nebo částečném kolapsu plic po celkové anestezii. Plicní embolie může být za určitých okolností život ohrožující nebo smrtelná. Nečinnost a další stavy mohou zvýšit výskyt krevních sraženin putujících do plic, což způsobí velkou krevní sraženinu, která může mít za následek smrt. Je důležité prodiskutovat se svým lékařem jakoukoli minulou historii otoků nohou nebo krevních sraženin, které mohou přispět k tomuto stavu. Srdeční komplikace jsou rizikem při každé operaci a anestezii, a to i u pacientů bez jakýchkoli příznaků. Pokud zaznamenáte dušnost, bolesti na hrudi nebo neobvyklé bušení srdce, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud dojde k některé z těchto komplikací, můžete vyžadovat hospitalizaci a další léčbu.

Žilní trombóza (sraženina) a následky:

Trombované žíly, které se podobají provazcům, se příležitostně vyvinou v oblasti prsu nebo kolem IV míst a obvykle vymizí bez lékařského nebo chirurgického ošetření. Je důležité prodiskutovat se svým chirurgem jakékoli antikoncepční pilulky, které užíváte. Některé pilulky s vysokým obsahem estrogenu mohou zvýšit riziko trombózy. Osobní anamnéza krvácení a problémů se srážlivostí může také zvýšit riziko trombózy.

death from all forms of surgical anesthesia or sedation.

Shock:

In rare circumstances, your surgical procedure can cause severe trauma, particularly when multiple or extensive procedures are performed. Although serious complications are infrequent, infections or excessive fluid loss can lead to severe illness and even death. If surgical shock occurs, hospitalization and additional treatments would be necessary.

Pain:

You will experience pain after your surgery. Pain of varying intensity and duration may occur and persist after the surgery. If you are a chronic pain patient being followed by a pain therapy practitioner, you may be asked to see this practitioner preoperatively to assist you in the management of your pain disorder during the post-operative period. Chronic pain may occur infrequently from nerves becoming trapped in the scar tissue or due to tissue stretching.

Cardiac and Pulmonary Complications: Pulmonary complications may occur secondarily to blood clots (pulmonary emboli), fat deposits (fat emboli), pneumonia, or partial collapse of the lungs after general anesthesia. Pulmonary emboli can be life threatening or fatal in some circumstances. Inactivity and other conditions may increase the incidence of blood clots traveling to the lungs, causing a major blood clot that may result in death. It is important to discuss with your physician any past history of swelling in your legs or blood clots that may contribute to this condition. Cardiac complications are a risk with any surgery and anesthesia, even in patients without any symptoms. If you experience shortness of breath, chest pains, or unusual heart beats, seek medical attention immediately. Should any of these complications occur, you may require hospitalization and additional treatments.

Venous Thrombosis (Clot) and Sequelae:

Thrombosed veins, which resemble cords, occasionally develop in the area of the breast or around IV sites, and usually resolve without medical or surgical treatments. It is important to discuss with your surgeon of any birth control pills you are taking. Certain high estrogen pills may increase your risk of thrombosed veins. Personal history of bleeding and clotting problems may also increase your risk of thrombosed veins.

Alergické reakce:

Ve vzácných případech byly hlášeny místní alergie na pásku, šicí materiál a lepidla, krevní produkty, topické přípravky a injekční přípravky. Mohou se objevit závažné systémové reakce včetně šoku (anafylaxe). reakce na léky používané během operace a léky na předpis. Alergické reakce mohou vyžadovat další léčbu. Je důležité informovat svého lékaře o všech předchozích alergických reakcích.

Reakce na léky:

Možné jsou neočekávané lékové alergie, nedostatečná reakce na léky nebo onemocnění způsobené předepsaným lékem. Je důležité, abyste informovali svého lékaře o všech problémech nebo alergiích, které jste měli s jakýmkoliv lékem, na předpis nebo bez něj, stejně jako o lécích, které nyní pravidelně užíváte. Poskytněte svému chirurgovi seznam léků a doplňků, které v současné době užíváte.

Chirurgické zvlhčovací roztoky:

Existuje možnost, že velké objemy tekutiny obsahující zředěná lokální anestetika a epinefrin injikované do tukových usazenin během operace mohou přispět k přetížení tekutin nebo systémovým reakcím na tyto léky. Může být nutná další léčba včetně hospitalizace.

Tuková/vzduchová embolie:

Ve vzácných případech, během nebo po liposukci a/nebo transplantaci tuku, mohou tukové částice nebo vzduch vstoupit do cévního systému a mohou se dostat do srdce, plic nebo mozku. To může vést k významným komplikacím, včetně smrti.

Trvalé otoky (lymfedém):

Po operaci se může objevit přetrvávající otok.

Neuspokojivý výsledek:

Přestože se očekávají dobré výsledky, neexistuje žádná záruka ani záruka, vyjádřená nebo předpokládaná, na výsledky, kterých lze dosáhnout. Karoserie není symetrická a téměř každý má určitou míru nerovnosti, které nemusí být předem rozpoznatelné. Jedna strana obličeje může být o něco větší, zatímco jedna strana obličeje může být povislejší. Oblasti prsou a trupu vykazují stejné možnosti. Mnohé z těchto problémů nelze plně napravit chirurgickým zákrokem. Čím realističtější budou vaše očekávání, tím lepší výsledky se vám budou jevit. Někteří pacienti nikdy nedosáhnou požadovaných cílů nebo výsledků, bez zavinění chirurga nebo operace. Můžete být zklamáni výsledky operace. Po operaci se může objevit asymetrie, neočekávaný tvar a velikost, ztráta funkce, narušení

Allergic Reactions:

In rare cases, local allergies to tape, suture material and glues, blood products, topical preparations and injected agents have been reported. Serious systemic reactions including shock (anaphylaxis) may occur in response to drugs used during the surgery and prescription medicines. Allergic reactions may require additional treatments. It is important to notify your physician of any previous allergic reactions.

Drug Reactions:

Unexpected drug allergies, lack of proper response to medication, or illness caused by the prescribed drug are all possible. It is important for you to inform your physician of any problems or allergies you have had with any medication, prescribed or over the counter, as well as the medications that you now regularly take. Provide your surgeon with a list of medications and supplements you are currently taking.

Surgical Wetting Solutions:

There is a possibility that large volumes of fluid containing dilute local anesthetic drugs and epinephrine injected into the fat deposits during the surgery may contribute to fluid overload or systemic reactions to these medications. Additional treatments including hospitalization may be necessary.

Fat/Air Embolism:

In rare cases, during or after liposuction and/or fat grafting, fat particles or air can enter the vascular system and can travel to the heart, lungs, or the brain. This can result in significant complications, including death.

Persistent Swelling (Lymphedema):

Persistent swelling can occur following surgery.

Unsatisfactory Result:

Although good results are expected, there is no guarantee or warranty, expressed or implied, on the results that may be obtained. The body is not symmetric, and almost everyone has some degree of unevenness, which may not be recognized in advance. One side of the face may be slightly larger, while one side of the face may be droopier. The breast and trunk areas exhibit the same possibilities. Many of such issues cannot be fully corrected with surgery. The more realistic your expectations are, the better your results will appear to you. Some patients never achieve their desired goals or results, at no fault of the surgeon or the surgery. You may be disappointed with the results of surgery. Asymmetry, unanticipated shape and size, loss of function, wound

rány, špatné hojení a ztráta citlivosti. Velikost může být nesprávná. Může se objevit nevyhovující umístění nebo vzhled jizvy po chirurgickém zákroku. Pro zlepšení výsledků může být nutné provést další operace. Neuspokojivé výsledky se NEMUSÍ zlepšit s každým dalším ošetřením.

DALŠÍ POKYNY

Léky a bylinné doplňky stravy:

Existují potenciální nežádoucí účinky, které se objevují v důsledku užívání volně prodejných, bylinných léků a/nebo léků na předpis. Aspirin a léky obsahující aspirin interferují s tvorbou krevních sraženin, a proto mohou přispívat k větším problémům s krvácením. Pokud máte zdravotní stav (jako je srdeční arytmie, srdeční stent, ucpaní krevních cév nebo krevní sraženiny) a užíváte léky na ředění krve, jako je Plavix®, Coumadin®, Xarelto®, Effient® nebo Pradaxa®, poraďte se o léčbě těchto léků přibližně v době operace s vaším plastickým chirurgem. Váš plastický chirurg může někdy koordinovat plán těchto léků s lékařem, který vám je předepsal pro váš zdravotní stav. Pokud vám byly předepsány léky na zdravotní stav, nevysazujte je, aniž byste to nejprve probrali se svým plastickým chirurgem. Náhlé vysazení těchto léků může mít za následek srdeční infarkt, mrtvici nebo smrt. Ujistěte se, že se se svým lékařem poradíte o jakýchkoli lékových interakcích, které mohou existovat s léky, které již užíváte. Pokud se u vás objeví nežádoucí reakce, okamžitě vysadte léky a zavolejte svého plastického chirurga pro další pokyny. Pokud je reakce závažná, okamžitě jděte na nejbližší pohotovost.

Při užívání předepsaných léků proti bolesti po operaci si uvědomte, že mohou ovlivnit váš myšlenkový proces a koordinaci. Během užívání těchto léků neřidte, neobsluhujte složité zařízení, nedělejte žádná důležitá rozhodnutí a nepijte alkohol. Ujistěte se, že užíváte předepsané léky pouze podle pokynů.

Vystavení slunci – přímé nebo solárium:

Účinky slunce poškozují pokožku. Vystavení ošetřovaných oblastí slunci může mít za následek zvýšené zjizvení, barevné změny a špatné hojení. Pacienti, kteří se opalují, ať už venku nebo v salonu, by měli informovat svého chirurga a léčbu buď odložit, popř. vyvarujte se opalování, dokud chirurg neřekne, že je bezpečné pokračovat. Ke škodlivému účinku slunečního záření dochází i při použití opalovacího krému nebo oděvu.

disruption, poor healing, and loss of sensation may occur after the surgery. Size may be incorrect. Unsatisfactory surgical scar location or appearance may occur. It may be necessary to perform additional surgeries to improve your results. Unsatisfactory results may NOT improve with each additional treatment.

ADDITIONAL ADVISORIES

Medications and Herbal Dietary Supplements:

There are potential adverse reactions that occur as a result of taking over-the-counter, herbal, and/or prescription medications. Aspirin and medications that contain aspirin interfere with formation of blood clots, and therefore may contribute to more bleeding issues. If you have a medical condition (such as heart arrhythmia, heart stent, blood vessel blockages, or blood clots), and are taking medical blood thinners such as Plavix®, Coumadin®, Xarelto®, Effient®, or Pradaxa®, discuss management of these medications around the time of the surgery with your plastic surgeon. Your plastic surgeon may sometimes coordinate a plan for these medications with the doctor that prescribed them to you for your medical condition. If you have been prescribed drugs for a medical condition, do not stop them without discussing it first with your plastic surgeon. Abruptly stopping these medications may result in a heart attack, stroke, or death. Be sure to check with your physician about any drug interactions that may exist with the medications that you are already taking. If you have an adverse reaction, stop the drugs immediately and call your plastic surgeon for further instructions. If the reaction is severe, go to the nearest emergency room immediately.

When taking the prescribed pain medications after surgery, realize that they can affect your thought process and coordination. Do not drive, operate complex equipment, make any important decisions, or drink alcohol while taking these medications. Be sure to take your prescribed medication only as directed.

Sun Exposure – Direct or Tanning Salon:

The effects of the sun are damaging to the skin. Exposing the treated areas to the sun may result in increased scarring, color changes, and poor healing. Patients who tan, either outdoors or in a salon, should inform their surgeon and either delay treatment or avoid tanning until the surgeon says it is safe to resume. The damaging effect of sun exposure occurs even with the use of sun block or clothing coverage.

Cestovní plány:

Všechny operace obsahují riziko komplikací, které mohou oddálit hojení a váš návrat do normálního života. Informujte prosím chirurga o všech plánech cesty, důležitých závazcích, které jste již naplánovali nebo naplánovali, nebo o časové náročnosti, která je pro vás důležitá, aby k operaci mohlo dojít ve vhodnou dobu. Neexistují žádné záruky, že budete moci obnovit všechny aktivity v požadovaném časovém rámci. Před cestou letadlem počkejte alespoň 10-14 dní. V případě dlouhého letu/cesty mohou být vyžadovány léky k prevenci DVT/PE v bezprostředním pooperačním období.

Dlouhodobé výsledky:

Následné změny vzhledu vašeho těla mohou nastat v důsledku stárnutí, slunění, hubnutí, přibírání, těhotenství, menopauzy a dalších okolností nesouvisejících s vaší operací.

Piercing:

Jedincům, kteří v současné době nosí piercingové šperky v oblasti chirurgického zákroku, se doporučuje, že by se touto činností mohla vyvinout infekce. Body-piercing šperky by měly být odstraněny před chirurgickým zákrokem.

Nehty:

K určení vašeho vitálního stavu během operace může váš poskytovatel anestezie vyžadovat přístup k vašim nehtům za účelem sledování. Ujistěte se, že v den operace máte alespoň dva nehty bez laku na nehty nebo akrylových nehtů.

Šperky:

V době chirurgického zákroku byste si neměli nosit šperky. Předměty, jako jsou náušnice, snubní prsteny a náhrdelníky, by měly být odstraněny a umístěny na bezpečném místě.

Budoucí těhotenství a kojení:

Není známo, že by tato operace narušovala těhotenství. Pokud plánujete těhotenství, kůže vašich prsou může natáhnout a kompenzovat výsledky operace. Po této operaci můžete mít s kojením větší potíže.

Informace pro pacientky:

Je důležité informovat svého plastického chirurga, pokud používáte antikoncepční pilulky nebo substituční estrogény, nebo pokud máte podezření, že byste mohla být těhotná. Mnoho léků včetně antibiotik může neutralizovat preventivní účinek antikoncepčních pilulek, což umožňuje početí a těhotenství.

Travel Plans:

All surgeries hold the risk of complications that may delay healing and your return to normal life. Please let the surgeon know of any travel plans, important commitments already scheduled or planned, or time demands that are important to you, so that the surgery can occur at an appropriate time. There are no guarantees that you will be able to resume all activities in the desired time frame. Allow at least 10-14 days prior to travelling via airplane. Medications may be required should you have a long flight/ trip to prevent DVT/PE in the immediate post-operative period.

Long-term Results:

Subsequent alterations in the appearance of your body may occur as a result of aging, sun exposure, weight loss, weight gain, pregnancy, menopause, and other circumstances not related to your surgery.

Body Piercing:

Individuals who currently wear body-piercing jewelry in the surgical region are advised that an infection could develop from this activity. Body-piercing jewelry should be removed prior to your surgical procedure.

Nails:

To determine your vital status during surgery, your anesthesia provider may require access to your fingernails for monitoring. Make sure to have at least two finger nails free of nail polish or acrylic nails on the date of your surgery.

Jewelry:

Jewelry should not be brought with you at the time of your surgical procedure. Items such as earrings, wedding rings, and necklaces should be removed and placed in a safe place.

Future Pregnancy and Breastfeeding:

This surgery is not known to interfere with pregnancy. If you are planning a pregnancy, your breast skin may stretch and offset the results of surgery. You may have more difficulty breast-feeding after this operation.

Information for Female Patients:

It is important to inform your plastic surgeon if you use birth control pills or estrogen replacement, or if you suspect you may be pregnant. Many medications including antibiotics may neutralize the preventive effect of birth control pills, allowing for conception and pregnancy.

Intimní vztahy po operaci:

Zotavení po operaci zahrnuje koagulaci krevních cév a zvýšená aktivita jakéhokoli druhu může tyto cévy otevřít, což vede ke krvácení nebo hematomu. Činnosti, které zvyšují váš puls nebo srdeční frekvenci, mohou způsobit další modřiny, otoky a potřebu vrátit se k operaci ke kontrole krvácení. Je moudré zdržet se intimních fyzických aktivit, dokud váš lékař neřekne, že je to bezpečné.

Poruchy duševního zdraví a elektivní chirurgie:

Je důležité, aby všichni pacienti, kteří chtějí podstoupit plánovanou operaci, měli realistická očekávání, která se zaměřují spíše na zlepšení než na dokonalost. Komplikace nebo méně než uspokojivé výsledky jsou někdy nevyhnutelné. Možná budete potřebovat další operace, které mohou být často stresující. Před operací prosím otevřeně diskutujte se svým chirurgem o jakékoli anamnéze významné emoční deprese nebo poruch duševního zdraví, které můžete mít. Ačkoli mnoho jedinců může mít psychologický prospěch z výsledků elektivního chirurgického zákroku, jejich účinky na duševní zdraví nelze přesně předvídat.

JE NUTNÁ DALŠÍ OPERAČNÍ OPERACE (Opětovné operace)

Existuje mnoho proměnných, které mohou ovlivnit dlouhodobý výsledek operace. Není známo, jak může vaše tkáň reagovat nebo jak dojde k hojení ran po operaci. Sekundární chirurgické zákroky mohou být nutné k provedení dodatečného utažení nebo přemístění tělesných struktur. Pokud dojde ke komplikacím, mohou být nutné další operace nebo jiná léčba. I když se rizika a komplikace vyskytují zřídka, uvedená rizika jsou spojena s touto operací. Mohou se objevit další komplikace a rizika, ale jsou méně časté. Praxe medicíny a chirurgie není exaktní věda. Přestože se očekávají dobré výsledky, neexistuje žádná záruka ani záruka, vyjádřená nebo předpokládaná, na výsledky, kterých lze dosáhnout. V některých situacích nemusí být možné dosáhnout optimálních výsledků jediným chirurgickým zákrokem. Vy a váš chirurg prodiskutujete dostupné možnosti, pokud budou doporučeny další operace. Za takové dodatečné procedury mohou vzniknout dodatečné náklady a výdaje, včetně chirurgických poplatků, poplatků za zařízení a anestezii a patologických a laboratorních vyšetření.

DODRŽOVÁNÍ PACIENTA

Pečlivě dodržujte všechny pokyny lékaře; to je nezbytné pro úspěch vašeho výsledku. Je důležité, aby chirurgické řezy nebyly během hojení vystaveny nadměrné síle, otoku, oděru nebo pohybu. Je třeba omezit osobní a profesní aktivity. Ochranné obvazy a

Intimate Relations After Surgery:

Recovery from surgery involves coagulating of blood vessels, and increased activity of any kind may open these vessels, leading to a bleed, or hematoma. Activities that increase your pulse or heart rate may cause additional bruising, swelling, and the need to return to surgery to control bleeding. It is wise to refrain from intimate physical activities until your physician states it is safe to do so.

Mental Health Disorders and Elective Surgery:

It is important that all patients seeking to undergo elective surgery have realistic expectations that focus on improvements rather than perfection. Complications or less-than-satisfactory results are sometimes unavoidable. You may require additional surgeries, which can often be stressful. Please openly discuss with your surgeon prior to surgery, of any history of significant emotional depression or mental health disorders that you may have. Although many individuals may benefit psychologically from the results of elective surgery, their effects on mental health cannot be accurately predicted.

ADDITIONAL SURGERY NECESSARY (Re-Operations)

There are many variables that may influence the long-term result of the surgery. It is unknown how your tissue may respond, or how wound healing will occur after the surgery. Secondary surgeries may be necessary to perform additional tightening or repositioning of body structures. Should complications occur, additional surgeries or other treatments may be necessary. Even though risks and complications occur infrequently, the risks cited are associated with this surgery. Other complications and risks can occur, but are less common. The practice of medicine and surgery is not an exact science. Although good results are expected, there is no guarantee or warranty, expressed or implied, on the results that may be obtained. In some situations, it may not be possible to achieve optimal results with a single surgical procedure. You and your surgeon will discuss the options available should additional surgeries be advised. There may be additional costs and expenses for such additional procedures, including surgical fees, facility and anesthesia fees, and pathology and lab testing.

PATIENT COMPLIANCE

Follow all physician's instructions carefully; this is essential for the success of your outcome. It is important that the surgical incisions are not subjected to excessive force, swelling, abrasion, or motion during the time of healing. Personal and vocational activities need to be restricted. Protective

drény by se neměly odstraňovat, pokud k tomu nedostane pokyn váš plastický chirurg. Úspěšná pooperační funkce závisí jak na operaci, tak na následné péči. Fyzické aktivity, které zvyšují váš puls nebo srdeční frekvenci, mohou způsobit modřiny, otoky, hromadění tekutin a nutnost návratu k operaci. Je důležité, abyste se účastnili následné péče a vrátili se na následnou péči, abyste podpořili zotavení po operaci.

Atestace

Kouření, expozice pasivnímu kouři, nikotinové výrobky (náplast, žvýkačky, nosní sprej):

Pacienti, kteří v současné době kouří nebo užívají tabákové či nikotinové výrobky (náplasti, žvýkačky nebo nosní sprej), jsou vystaveni většímu riziku závažných chirurgických komplikací ztráty kůže a opožděného hojení, jakož i dalších jizev. Jedinci vystaveni pasivnímu kouření jsou také vystaveni potenciálnímu riziku podobných komplikací, které lze připsat expozici nikotinu. Kromě toho může mít kouření významné negativní účinky na zotavení z anestezie a pravděpodobně vede ke zvýšenému kašli a krvácení. Jedinci, kteří nejsou vystaveni tabákovému kouři nebo produktům obsahujícím nikotin, mají výrazně nižší riziko tohoto typu komplikací.

Spánková apnoe/CPAP:

Jedinci, kteří mají poruchy dýchání, jako je „obstrukční spánková apnoe“, a ti, kteří se mohou spoléhat na zařízení CPAP (kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách) nebo používat noční kyslík, je jim doporučeno, že jsou vystaveni značnému riziku zástavy dechu a smrti, když po operaci berou narkotické léky proti bolesti. Toto je důležité hledisko při hodnocení bezpečnosti chirurgických zákroků z hlediska velmi závažných komplikací, včetně úmrtí, které souvisí s již existujícími zdravotními stavy. O operaci lze uvažovat pouze v případě, že je pooperační sledování prováděno v nemocničním prostředí, aby se snížilo riziko potenciálních respiračních komplikací a bezpečně zvládala bolest po operaci.

Zvažte prosím následující příznaky spánkové apnoe:

- Jsem často unavený po probuzení a po celý den
- Mám problém zůstat v noci spát
- Bylo mi řečeno, že během spánku chrápu nebo přestávám dýchat
- Celou noc se probouzím nebo se neustále otáčím ze strany na stranu
- Bylo mi řečeno, že mi při spánku cukají nohy nebo ruce
- Během spánku vydávám náhlé smrkavé zvuky
- Cítím se unavený nebo během dne usínám

dressings and drains should not be removed unless instructed to do so by your plastic surgeon. Successful post-operative function depends on both the surgery and subsequent care. Physical activities that increase your pulse or heart rate may cause bruising, swelling, fluid accumulation, and the need to return to surgery. It is important that you participate in follow-up care and return for aftercare to promote your recovery after surgery.

ATTESTATIONS

Smoking, Second-hand Smoke Exposure, Nicotine Products (Patch, Gum, Nasal Spray):

Patients who are currently smoking or use tobacco or nicotine products (patch, gum, or nasal spray) are at a greater risk for significant surgical complications of skin loss and delayed healing as well as additional scarring. Individuals exposed to second-hand smoke are also at potential risk for similar complications attributable to nicotine exposure. Additionally, smoking may have significant negative effects on recovery from anesthesia, and possibly leads to increased coughing and bleeding. Individuals who are not exposed to tobacco smoke or nicotine-containing products have a significantly lower risk of these type of complications.

Sleep Apnea/CPAP:

Individuals who have breathing disorders such as “obstructive sleep apnea,” and those who may rely on CPAP devices (continuous positive airway pressure) or utilize nighttime oxygen are advised that they are at substantive risk for respiratory arrest and death when they take narcotic pain medications following surgery. This is an important consideration when evaluating the safety of surgical procedures in terms of very serious complications, including death, that relate to pre-existing medical conditions. Surgery may be considered only if post-surgical monitoring is conducted in a hospital setting in order to reduce risk of potential respiratory complications, and to safely manage pain following surgery.

Please consider the following symptoms of sleep apnea:

- I am frequently tired upon waking and throughout the day
- I have trouble staying asleep at night
- I have been told that I snore or stop breathing during sleep
- I wake up throughout the night or constantly turn from side to side
- I have been told that my legs or arms jerk while I'm sleeping

Je důležité, abyste informovali o kterémkoli z výše uvedených příznaků, které jste zažili, a projednali je se svým chirurgem.

DVT/PE rizika a poradenství:

Při každém chirurgickém zákroku existuje riziko krevních sraženin, hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE). Liší se podle níže uvedených rizikových faktorů. Čím vyšší jsou rizikové faktory, tím větší je riziko a tím více musíte být zapojeni jak do pochopení těchto rizik, tak do chůze a pohybu nohou, pokud vám to lékař dovolí. Ke snížení rizika mohou být také použity punčochy na nohy, přerušovaná pneumatická kompresní zařízení a léky.

Existuje mnoho stavů, které mohou zvýšit nebo ovlivnit riziko srážení. Informujte svého lékaře o jakékoli minulé nebo současné anamnéze některého z následujících:

Krevní sraženiny v anamnéze Rodinná anamnéza krevních sraženin Antikoncepční pilulky

- _____ Léky stimulující hormony Oteklé nohy
- _____ Historie rakoviny
- _____ Velká dávka vitamínů
- _____ Křečové žíly
- _____ Dřívější onemocnění srdce, jater, plic nebo gastrointestinálního traktu.
- _____ Historie vícenásobných samovolných potratů nebo samovolných potratů

Rozumím rizikům souvisejícím s DVT/PE a jak důležité je dodržovat terapii, kterou jsem projednal s mým chirurgem. Mezi metody preventivní terapie patří:

- Včasná chůze, pokud je povolena
- Kompresní zařízení (SCD/ICD) _____ Antikoagulační protokoly, pokud jsou povoleny
- nebo vysoce rizikových pacientů, rizika VTE jsou stále vysoká i při vhodné chemoprophylaxi. Pokud je vaše operace elektivní a jste vysoce rizikový pacient, je nejlepší zvážit, zda v takové elektivní operaci nepokračovat

___ I make abrupt snorting noises during sleep

___ I feel tired or fall asleep during the day

It is important for you to inform and discuss any of the above symptoms that you have experienced with your surgeon.

DVT/PE Risks and Advisory:

There is a risk of blood clots, deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolus (PE) with every surgical procedure. It varies with the risk factors below. The higher the risk factors, the greater the risk and the more involved you must be in both understanding these risks, and when permitted by your physician, walking and moving your legs. Leg stockings, intermittent pneumatic compression devices, and medicines may also be used to help lower your risk.

There are many conditions that may increase or affect risks of clotting. Inform your doctor about any past or present history of any of the following:

Past history of blood clots Family history of blood clots Birth control pills

- _____ Hormone stimulating drugs Swollen legs
- _____ History of cancer
- _____ Large dose of vitamins
- _____ Varicose veins
- _____ Past illnesses of the heart, liver, lung, or gastrointestinal tract.
- _____ History of multiple spontaneous abortions or miscarriages

I understand the risks relating to DVT/PE and how important it is to comply with therapy as discussed with my surgeon. The methods of preventative therapy include:

- Early ambulation when allowed
- Compression devices (SCD/ICD) _____ Anticoagulation Protocols when Allowed
- or high risk patients, the risks of VTE are still high even with appropriate chemoprophylaxis. If your surgery is elective, and you are a high risk patient, it is best to consider not proceeding with such elective

Dokumenty informovaného souhlasu se používají ke sdělování informací o navrhované chirurgické léčbě onemocnění nebo stavu spolu se zveřejněním rizik a alternativních forem léčby, včetně žádné operace. Proces informovaného souhlasu se pokouší definovat zásady zveřejňování rizik, které by obecně měly ve většině případů splňovat potřeby většiny pacientů.

Dokumenty informovaného souhlasu by však neměly být považovány za všezahrnující při definování dalších metod péče a rizik, s nimiž se setkáváme. Váš plastický chirurg vám může poskytnout doplňující nebo odlišné informace, které vycházejí ze všech skutečností ve vašem konkrétním případě a ze současného stavu lékařských znalostí.

Dokumenty s informovaným souhlasem nejsou určeny k tomu, aby definovaly nebo sloužily jako standard lékařské péče. Standardy lékařské péče se určují na základě všech skutečností souvisejících s případem jednotlivce a podléhají změnám s pokrokem vědeckých poznatků a technologií a s vývojem vzorců praxe.

SOUHLAS K OPERACI/POSTUPU NEBO LÉČBĚ

1. Tímto zmocňuji Dr. _____ a vybrané asistenty k provádění operace liftingu hýždí.

2. Obdržel jsem následující informační list: Operace liftingu hýždí.

3. Beru na vědomí, že v průběhu operace a lékařského ošetření nebo anestezie si nepředvídané okolnosti mohou vyžádat jiné postupy než ty, které jsou uvedeny výše. Zmocňuji proto výše uvedeného lékaře a asistenty nebo určené osoby k provádění takových dalších výkonů, které jsou podle jeho odborného úsudku považovány za nezbytné a žádoucí. Oprávnění udělené podle tohoto odstavce zahrnuje všechny stavy, které vyžadují léčbu a nejsou mému lékaři v době zákroku známy.

4. Souhlasím s podáváním takových anestetik, která jsou považována za nezbytná nebo vhodná. Chápu, že všechny formy anestezie zahrnují rizika a přinášejí možnost komplikací, zranění a někdy i smrti.

5. Rozumím tomu, co můj chirurg může a nemůže dělat, a že neexistují žádné záruky nebo záruky, předpokládané nebo konkrétní, ohledně mého výsledku. Měl jsem příležitost vysvětlit své cíle a pochopit, které požadované výsledky jsou reálné a které ne. Všechny mé otázky byly zodpovězeny a rozumím inherentním (specifickým) rizikům postupů, které hledám, stejně jako dalším rizikům a

Informed-consent documents are used to communicate information about the proposed surgical treatment of a disease or condition, along with disclosure of risks and alternative forms of treatment(s), including no surgery. The informed-consent process attempts to define principles of risk disclosure that should generally meet the needs of most patients in most circumstances.

However, informed-consent documents should not be considered all-inclusive in defining other methods of care and risks encountered. Your plastic surgeon may provide you with additional or different information, which is based on all the facts in your particular case and the current state of medical knowledge.

Informed-consent documents are not intended to define or serve as the standard of medical care. Standards of medical care are determined on the basis of all of the facts involved in an individual's case, and are subject to change as scientific knowledge and technology advance, and as practice patterns evolve.

CONSENT for SURGERY/PROCEDURE or TREATMENT

1. I hereby authorize Dr. _____ and selected assistants to perform Buttock Lift Surgery.

2. I have received the following information sheet: Buttock Lift Surgery.

3. I recognize that during the course of the operation and medical treatment or anesthesia, unforeseen conditions may necessitate different procedures than those outlined above. I therefore authorize the above physician and assistants or designees to perform such other procedures that are deemed necessary and desirable according to his or her professional judgment. The authority granted under this paragraph shall include all conditions that require treatment and are not known to my physician at the time of the procedure.

4. I consent to the administration of such anesthetics as considered necessary or advisable. I understand that all forms of anesthesia involve risks, and carry the possibility of complications, injuries, and sometimes death.

5. I understand what my surgeon can and cannot do, and that there are no warranties or guarantees, implied or specific, about my outcome. I have had the opportunity to explain

<p>komplikacím, výhodám a alternativám. Když tomu všemu rozumím, rozhodl jsem se pokračovat.</p> <p>6. Souhlasím s tím, že budu fotografován nebo vyslán v televizi před, během a po operacích nebo postupech, které mají být provedeny, včetně příslušných částí mého těla, pro lékařské, vědecké nebo vzdělávací účely, za předpokladu, že nebude odhalena moje totožnost podle obrázků.</p> <p>7. Pro účely dalšího vzdělávání lékařů souhlasím s přijetím pozorovatelů na operační sál.</p> <p>8. Souhlasím s likvidací nebo výzkumem jakékoli tkáně, lékařských zařízení nebo částí těla, které mohou být odstraněny.</p> <p>9. Jsem si vědom(a) toho, že používání krevních produktů představuje potenciální významná rizika pro mé zdraví a souhlasím s jejich použitím, pokud to můj chirurg a/nebo jím pověření budou považovat za nutné.</p> <p>10. Povoluji předání mého čísla sociálního zabezpečení příslušným agenturám za účelem právního hlášení a registrace lékařského zařízení, je-li to relevantní.</p> <p>11. Beru na vědomí, že poplatky za chirurgy jsou odděleny od poplatků za anestezii a nemocniční poplatky a poplatky jsou pro mě přijatelné. Je-li nezbytný sekundární postup, budou nutné další výdaje.</p> <p>12. Uvědomuji si, že nebýt operace je možnost. Odmítám tento postup _____.</p> <p>13. BYLO MI VYSVĚTLENO ZPŮSOBEM, KTERÝM ROZUMÍM:</p> <p>1. VÝŠE UVEDENÉ OŠETŘENÍ NEBO POSTUP, KTERÝ MUSÍ BÝT PROVÁDĚT</p> <p>2. MOHOU EXISTOVAT ALTERNATIVNÍ POSTUPY NEBO ZPŮSOBY LÉČBY</p> <p>3. NAVRHOVANÝ POSTUP NEBO LÉČBA VZTAHUJÍ K RIZIKŮM</p> <p>Navrhovaný typ a velikost implantátu: </p> <p>SOUHLASÍM S OŠETŘENÍM NEBO POSTUPEM A VÝŠE UVEDENÝMI POLOŽKAMI (1-12). S VYSVĚTLENÍM JSEM SPOKOJEN.</p>	<p>my goals, and understand which desired outcomes are realistic and which are not. All of my questions have been answered, and I understand the inherent (specific) risks to the procedures I seek, as well as those additional risks and complications, benefits, and alternatives. Understanding all of this, I elect to proceed.</p> <p>6. I consent to be photographed or televised before, during, and after the operation(s) or procedure(s) to be performed, including appropriate portions of my body, for medical, scientific or educational purposes, provided my identity is not revealed by the pictures.</p> <p>7. For purposes of advancing medical education, I consent to the admittance of observers to the operating room.</p> <p>8. I consent to the disposal or research of any tissue, medical devices, or body parts that may be removed.</p> <p>9. I am aware that there are potential significant risks to my health with the utilization of blood products, and I consent to their utilization should they be deemed necessary by my surgeon and/or his/her appointees.</p> <p>10. I authorize the release of my Social Security number to appropriate agencies for legal reporting and medical-device registration, if applicable.</p> <p>11. I understand that the surgeons' fees are separate from the anesthesia and hospital charges, and the fees are agreeable to me. If a secondary procedure is necessary, further expenditure will be required.</p> <p>12. I realize that not having the operation is an option. I opt out of having this procedure _____.</p> <p>13. IT HAS BEEN EXPLAINED TO ME IN A WAY THAT I UNDERSTAND:</p> <p>1. THE ABOVE TREATMENT OR PROCEDURE TO BE UNDERTAKEN</p> <p>2. THERE MAY BE ALTERNATIVE PROCEDURES OR METHODS OF TREATMENT</p> <p>3. THERE ARE RISKS TO THE PROCEDURE OR TREATMENT PROPOSED</p> <p>Proposed type and size of implant: </p> <p>I CONSENT TO THE TREATMENT OR PROCEDURE AND THE ABOVE LISTED ITEMS (1-12). I AM SATISFIED WITH THE EXPLANATION.</p>
--	---

V Praze dne / In Prague on

Podpis lékaře / Signature:.....

Klient/ka / Client :

.....